

RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN FIAVAC-COLAVAC EN ARGENTINA

CANINA		
VACUNAS ESENCIALES	ADMINISTRACIÓN	PRIMER REFUERZO
VVM o Moquillo recombinante + VVM Parvovirus + VVM Adenovirus-2+ Parainfluenza (producto combinado)	Se recomiendan 3 dosis entre 6 y 16 semanas de edad. <u>Ejemplo:</u> 8 semanas; y 12 semanas; y 16 semanas de edad.	Administrar una dosis única (de un producto combinado) no más de 1 año después de la última dosis de la serie inicial.
Rabia (VM)	Administrar una dosis única no antes de 12 semanas	Anual por ley
Leptospirosis (BM) 4-serovares	2 dosis iniciales, con 3 a 4 semanas de diferencia. primera dosis a 12 semanas	Semestral en lugares de alta prevalencia y anual en el resto.
VACUNAS OPCIONALES	ADMINISTRACIÓN	DE REFUERZO
B. bronchiseptica + virus de parainfluenza (intranasal solamente) (algunos productos IN también pueden contener antígeno CAV-2)	Dosis única (intranasal) a las 12 o 16 semanas Dar a partir de 3 a 4 sem. edad.	Cuando se mantiene el riesgo de exposición, administrar una sola dosis 1 año después de la última dosis administrada.
B. bronchiseptica solamente (monovalente) > Administración parenteral (BM)	Parenteral (SC): Se requieren dos dosis, con 2 a 4 semanas de separación.	Cuando se mantiene el riesgo de exposición, administrar una sola dosis 1 año después de la última dosis administrada.

FELINA		
VACUNAS ESENCIALES	ADMINISTRACIÓN	PRIMER REFUERZO
VVM Panleucopenia + VVM Herpesvirus + VVM Calicivirus+	2 y 3 meses y luego a las 20 semanas de edad si riesgo es lato.	No más de 1 año después de la última dosis de la serie inicial. Repetir anualmente.
Rabia VM [con adyuvante]	Una sola dosis generalmente administrada a las 12 ó 16 semanas	Administrar 1 vez por año (se aplica la ley nacional)
VACUNAS OPCIONALES	ADMINISTRACIÓN	RECOMENDACIONES DE REFUERZO
Virus recombinante de la leucemia felina (ViLeF) [sin adyuvante]	"Altamente Recomendada" para todos los gatitos: Administrar 1 dosis tan pronto como las 8 semanas de edad seguida de una segunda dosis 3-4 semanas después. Refuerzo 1 año después. Se recomiendan 2 dosis a las 12 y 16 semanas, seguido de un refuerzo 1 año después de la finalización de la serie inicial.	Cuando exista el riesgo de exposición... administrar una sola dosis anual de allí en adelante.
Virus de la leucemia felina VM [con adyuvante]		

Referencias: VVM: virus vivo modificado VM; virus muerto BM: Bacteria muerta