

ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO

FIAVAC-COLAVAC EN BRASIL

CAES					
Doença (antígeno vacinal)		Vacinação inicial (< 16 sem)	Vacinação inicial (> 16 sem)	Revacinação (reforços)	Comentários
Cinomose (CDV)	Vacina infectante (viva atenuada ou recombinante) parenteral	Início entre 6-8 sem, com repetições a cada 3-4 sem, última dose após 16 sem	2 doses com intervalo de 3-4 sem	Com 1 ano de idade, então a cada 2 anos	Essencial
Parvovirose (CPV-2)	Vacina infectante (viva atenuada), parenteral	Início entre 6-8 sem, com repetições a cada 3-4 sem, sendo a última dose após 16 sem	2 doses com intervalo de 3-4 sem	Com 1 ano de idade, então a cada 2 anos	Essencial
Hepatite infecciosa canina (CAV-2)	Vacina infectante (viva atenuada) parenteral	Início entre 6-8 sem, com repetições a cada 3-4 sem, sendo a última dose após 16 sem	2 doses com intervalo de 3-4 sem	Com 1 ano de idade, então a cada 2 anos	Essencial*
Raiva (vírus rábico)	Vacina não infectante (morta) parenteral	Início a partir de 12 semanas, dose única	Dose única	Com 1 ano de idade, então a cada 1-3 anos, conforme legislação vigente	Essencial
Leptospirose (<i>Leptospira interrogans</i>)	Vacina não infectante (morta) parenteral	Início entre 10-12 sem, com repetições a cada 3-4 sem, sendo a última dose após 16 sem	2 doses com intervalo de 3-4 sem	Com 1 ano de idade, então anualmente	Essencial Proteção sorovar específica
Adenovirose respiratória (CAV-2)	Vacina infectante (viva atenuada) parenteral	Início entre 6-8 sem, com repetições a cada 3-4 sem, sendo a última dose após 16 sem	2 doses com intervalo de 3-4 sem	Com 1 ano de idade, então a cada 2 anos	Complementar
	Vacina infectante (viva modificada) intranasal	Início entre 6-8 sem, dose única	Dose única	Anualmente	Complementar
Parainfluenza (CPIV)	Vacina infectante (viva atenuada) parenteral	Início entre 6-8 sem, com repetições a cada 3-4 sem, sendo a última dose após 16 sem	2 doses com intervalo de 3-4 semanas	Com 1 ano de idade, então a cada 2 anos	Complementar
	Vacina infectante (viva atenuada) intranasal	Início entre 6-8 sem, dose única	Dose única	Anualmente	Complementar
Bordetelose (Bordetella bronchiseptica)	Vacina não infectante (morta) parenteral	Início entre 6-8 sem, com repetição após 3-4 sem	2 doses com intervalo de 3-4 sem	Anualmente	Complementar
	Vacina infectante (viva atenuada) intranasal	Início entre 6-8 sem, dose única	Dose única	Anualmente	Complementar
Coronavirose (CCoV)	Vacinas infectantes (vivas atenuadas) ou não infectantes (mortas) parenterais	Não recomendadas			
Giardiase (<i>Giardia lamblia</i>)	Vacina não infectante (morta) parenteral	Início a partir de 8 sem, 2 doses com intervalo de 2-4 sem	2 doses com intervalo de 2-4 sem	Anualmente	Complementar
Leishmaniose visceral	Vacina infectante (recombinante de proteína A2 de <i>Leishmania</i> sp)	Início a partir de 16 sem, 3 doses com intervalo de 3 sem	3 doses com intervalo de 3 sem	Anualmente	Complementar**

ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO

FIAVAC-COLAVAC EN BRASIL

FELINOS					
Doença (antígeno vacinal)		Vacinação inicial (< 16 semanas)	Vacinação inicial (> 16 semanas)	Revacinação (reforços)	Comentários
Panleucopenia (FPV)	Vacina infectante (viva atenuada) parenteral	Início entre 6-8 sem, com repetições a cada 3-4 sem, com última dose após 16 sem	2 doses com intervalo de 3-4 sem	Com 1 ano, então a cada 3 anos	Essencial
	Vacina não infectante (morta) parenteral				Complementar*
Rinotraqueíte (FHV-1)	Vacina infectante (viva atenuada) parenteral	Início entre 6-8 sem, com repetições a cada 3-4 sem até 16 sem	2 doses com intervalo de 3-4 sem	Com 1 ano, então a cada 1-3 anos, conforme o risco	Essencial
	Vacina não infectante (morta) parenteral				Complementar*
Raiva (vírus rábico)	Vacina não infectante (morta) parenteral	Início a partir de 12 sem, dose única	Dose única	Com 1 ano de idade, então a cada 1-3 anos, conforme legislação vigente	Essencial
Calicivirose (FCV)	Vacina infectante (viva atenuada) parenteral	Início entre 6-8 sem, com repetições a cada 3-4 sem até 16 sem	2 doses com intervalo de 3-4 sem	Com 1 ano, então a cada 1-3 anos, conforme o risco	Essencial
	Vacina não infectante (morta) parenteral				Complementar *
Calicivirose (VS-FCV)	Vacina não infectante (morta) parenteral	Início entre 6-8 sem, com repetições a cada 3-4 sem até 16 sem	2 doses com intervalo de 3-4 sem	Com 1 ano, então anualmente	Complementar **
Leucemia viral felina (FeLV)	Vacina não infectante (morta) parenteral	Início a partir de 8 sem, 2 doses com intervalo de 3-4 sem	2 doses com intervalo de 3-4 sem	Com 1 ano de idade, então a cada 2 anos enquanto houver risco de infecção	Essencial para gatos < 1 ano de idade Complementar >1 año ***
Clamidiose (Chlamydia felis)	Vacina infectante (viva atenuada) parenteral	Início a partir de 8 sem, 2 doses com intervalo de 3-4 sem	2 doses com intervalo de 3-4 sem	Com 1 ano, então anualmente	Complementar
	Vacina não infectante (morta) parenteral				Complementar